



ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΘΑΝΑΤΩΣΕΤΕ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Τα πουλερικά που δεν μπορούν να μεταφερθούν πρέπει να θανατωθούν στο αγρόκτημα. Μπορούν επίσης να θανατωθούν στο αγρόκτημα για λόγους όπως ασθένεια, αργή ανάπτυξη ή για προμήθεια κρέατος απευθείας σε καταναλωτές/λιανοπωλητές. Η αναισθητοποίηση είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση. Αναισθητοποιήστε και **θανατώστε τα όσο το δυνατόν πιο σύντομα** για ανώδυνο θάνατο.

Αυτές οι πληροφορίες δεν υπερισχύουν των **εθνικών κανόνων** που απαγορεύουν ή περιορίζουν κάποια από αυτές τις πρακτικές.


Η αναισθητοποίηση και η θανάτωση πρέπει να γίνονται από εργαζόμενους με επαρκές επίπεδο ικανότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

- ✦ Τα πουλερικά είναι κοινωνικά ζώα αλλά πανικοβάλλονται γρήγορα
- ✦ **Θέλουν:** καλά φωτισμένες περιοχές
- ✦ **Αντιπαθούν:** άμεσο ηλιακό φως, ρεύματα

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

- ✦ Τα τραυματισμένα πτηνά ίσως να μην μπορούν να μετακινηθούν ανώδυνα. Αναισθητοποιήστε και θανατώστε τα εκεί που βρίσκονται **όσο το δυνατόν πιο γρήγορα**



ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ/ ΘΑΝΑΤΩΣΗ

Μόλις ακινητοποιήσετε τα πουλερικά, μπορείτε να εξετάσετε τις ακόλουθες μεθόδους:

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ


Επειδή αυτή η μέθοδος μπορεί να μην σκοτώσει το πτηνό, πρέπει να το θανατώσετε εντός 15 δευτερολέπτων.

Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια

Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται γύρω από το κεφάλι του πτηνού, **ανάμεσα στο μάτι και το αυτί**

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις

- ✦ Ρεύμα: κοτόπουλα 240 mA, γαλοπούλες 400 mA ή υψηλότερο
- ✦ Τάση: πάνω από 110 V
- ✦ Διάρκεια: τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα



2. ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ/ΜΗ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ


Η διεισδυτική διατρητική ράβδος περνάει μέσω του κρανίου στον εγκέφαλο. Η μη διεισδυτική διατρητική ράβδος χτυπά το μέτωπο χωρίς να διαπερνά το κρανίο.

Τοποθετήστε τη ράβδο

- ✦ Τοποθετήστε τη ράβδο πάνω στο κεφάλι, **στοχεύοντας κάτω**

Ελέγξτε τις παραμέτρους

- ✦ Διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για να ελέγξετε ότι η ράβδος, η φόρτιση και πίεση είναι σωστές
- ✦ Μη διεισδυτική: επίπεδη κεφαλή για κοτόπουλα, κυρτή για πάπιες, χήνες και γαλοπούλες
- ✦ Θανατώστε εντός 1 λεπτού



3. ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΑ

Η εξάρθρωση του αυχένα χωρίζει τη ραχοκοκαλιά από το κεφάλι. Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να θανατώσετε έως 70 πτηνά τη μέρα.

Ακινετοποιήστε και τοποθετήστε το πτηνό

- ✦ Με το ένα χέρι ανασπώστε και **κρατήστε το πτηνό από τα πόδια του**
- ✦ Κλείστε τα δάκτυλα του άλλου χεριού **γύρω από το λαιμό του πτηνού** πίσω από το κρανίο του
- ✦ Με μία συνεχή κίνηση:
 1. Τραβήξτε και τα δύο χέρια **γρήγορα και σφικτά** σε αντίθετες κατευθύνσεις
 2. Σπρώξτε πίσω το κεφάλι απότομα



4. ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΟ ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ

Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να θανατώσετε έως 70 πτηνά τη μέρα.

Ακινετοποιήστε και τοποθετήστε το πτηνό

- ✦ Κρατήστε το πτηνό από τα πόδια του
- ✦ Τοποθετήστε το κεφάλι του σε σκληρή επιφάνεια
- ✦ Χτυπήστε το πίσω μέρος του κεφαλιού του με βαρύ, εύχρηστο αντικείμενο

Ελέγξτε αν έχει τις αισθήσεις του

Μετά τη χρήση των μεθόδων διατρητικής ράβδου, χτυπήματος στο κεφάλι ή εξάρθρωσης, ελέγξτε τα εξής:



δεν ανοιγοκλείνει τα μάτια όταν τα ακουμπάτε

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το πτηνό έχει ακόμα τις αισθήσεις του:

- ✦ Μην το θανατώσετε
- ✦ **Αναισθητοποιήστε ξανά με εφεδρική μέθοδο**
- ✦ Προσδιορίστε τι πήγε λάθος
- ✦ Διορθώστε τα προβλήματα πριν αναισθητοποιήσετε ξανά

Για να επιβεβαιώσετε το θάνατο του πτηνού, ελέγξτε τα εξής:

- ✦ Δεν κάνει αυθόρμητη κίνηση
- ✦ Άνευρο πτώμα/φτερά
- ✦ Δεν αναπνέει
- ✦ Η αιμορραγία έχει σταματήσει



Υπηρεσία Εκδόσεων

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018
Η περαιτέρω χρήση επιτρέπεται εφόσον αναφέρεται η πηγή.
Printed in Belgium.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
<http://europa.eu/!KX74dw> (Μόνο αγγλικά)