



ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ/ΘΑΝΑΤΩΣΕΤΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Τα αιγοπρόβατα που δεν μπορούν να μεταφερθούν πρέπει να θανατωθούν στο αγρόκτημα. Μπορούν επίσης να θανατωθούν στο αγρόκτημα για άλλους λόγους, όπως ασθένεια ή αργή ανάπτυξη. Η αναισθητοποίηση είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση. Αναισθητοποιήστε τα και **θανατώστε τα εντός 15 δευτερολέπτων** για ανώδυνο θάνατο. Απαιτείται σωστός χειρισμός και ακινητοποίηση για αποτελεσματική αναισθητοποίηση.

Αυτές οι πληροφορίες δεν υπερισχύουν των **εθνικών κανόνων** που ενδεχομένως απαγορεύουν ή περιορίζουν κάποια από αυτές τις πρακτικές.

Η αναισθητοποίηση και η θανάτωση πρέπει να γίνονται από εργαζόμενους με επαρκές επίπεδο ικανότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

- ✦ Τα αιγοπρόβατα είναι ζώα αγέλης που θέλουν να παραμένουν σε ομάδες και γίνονται ανήσυχα όταν χωρίζονται
- ✦ Τα αιγοπρόβατα γαλακτοπαραγωγής είναι συνήθως ήρεμα, αλλά τα αιγοπρόβατα που εκτρέφονται για το κρέας/μαλλί γίνονται πιο ανήσυχα
- ✦ Τα κριάρια/οι τράγοι μπορεί να είναι απρόβλεπτοι και απαιτείται προσεκτικός χειρισμός
- ✦ Οι γίδες/προβατίνες γίνονται επιθετικές αν χωριστούν από τα μικρά τους/αρνάκια
- ✦ Κάθε πρόβατο ή αίγα μπορεί να ανταποκρίνεται διαφορετικά

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ετοιμάστε το πρόβατο ή την αίγα

- ✦ Βεβαιωθείτε ότι το **μαλλί του ζώου είναι στεγνό**
- ✦ Ελέγξτε ότι οι **ακίδες των ηλεκτροδίων είναι υγρές** ή εναλλακτικά αφαιρέστε μαλλί από την περιοχή όπου θα τοποθετηθούν ηλεκτρόδια
- ✦ Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή τοποθέτησης ηλεκτροδίων είναι υγρή
- ✦ Ελέγξτε ότι οι **λαβίδες έχουν σωστό μέγεθος/δεν είναι διαβρωμένες**
- ✦ Φορέστε λαστιχένια γάντια και μπότες


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΘΑΝΑΤΩΣΗ

Μόλις ακινητοποιήσετε το πρόβατο ή την αίγα, η απλούστερη μέθοδος θανάτωσης με ηλεκτρικές λαβίδες είναι πρώτα η αναισθητοποίηση του κεφαλιού και μετά η εφαρμογή ρεύματος στην καρδιά (μαρμαρυγή).

ΦΑΣΗ 1: ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια


- ✦ Πένσες χειρός: τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια ανάμεσα στις εξωτερικές γωνίες των ματιών και τη βάση των αυτιών
- ✦ Συσκευή για κεφαλή και πλάτη: τοποθετήστε τη συσκευή ανάμεσα στα αυτιά με ηλεκτρόδια πάνω στο κεφάλι
- ✦ **Μην τοποθετείτε ποτέ πίσω από τα αυτιά**



Αυτό θα διακόψει τη λειτουργία της καρδιάς του προβάτου/της αίγας σκοτώνοντάς το. Ελέγξτε ότι το πρόβατο/η αίγα δεν έχει τις αισθήσεις του πριν ξεκινήσετε τη φάση 2.

Ελέγξτε την τοποθέτηση

- ✦ Εφαρμόστε ρεύμα που καλύπτει την καρδιά σε κάθε πλευρά του στήθους, ακριβώς πίσω από τα μπροστινά πόδια



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αν το πρόβατο ή η αίγα έχει ακόμα τις αισθήσεις του:

- ✦ Μην εφαρμόσετε το ρεύμα στην καρδιά (φάση 2)
- ✦ Αναίσθητοποιήστε το ξανά σε άλλο σημείο και με άλλη συσκευή
- ✦ Δείτε τι πήγε λάθος
- ✦ Τοποθετήστε το σωστά πριν αναίσθητοποιήσετε ξανά

Θανατώστε το πρόβατο ή την αίγα

Εφαρμόστε τη φάση 2 εντός 15 δευτερολέπτων από την αναίσθητοποίηση


δεν ανοιγοκλείνει τα μάτια (αυθόρμητα ή όταν αγγίζετε τα μάτια)

δεν ανταποκρίνεται σε τσίμπημα στη μύτη/στο αυτί

δεν αναπνέει κανονικά

δεν κάνει θόρυβο

δεν επιχειρεί να σταθεί/σηκώσει το κεφάλι



έχει άκαμπτα/εκτεταμένα πόδια, με συσπάσεις/κλωτσιές

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

Ελέγξτε τα εξής:

- ✦ Δεν κάνει αυθόρμητη κίνηση
- ✦ Άνευρο σώμα/σε μόνιμη κατάρρευση
- ✦ Δεν ανταποκρίνεται σε τσίμπημα στη μύτη/στο αυτί
- ✦ Δεν κάνει θόρυβο/δεν αγκομαχεί
- ✦ Δεν αναπνέει
- ✦ Διεσταλμένες κόρες
- ✦ Η αιμορραγία έχει σταματήσει
- ✦ Δεν έχει παλμούς

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΘΑΝΑΤΩΣΗ

Ελάχιστη τάση (βολτ – V)	Ελάχιστο ρεύμα (αμπέρ – A)	Συχνότητα (hertz – Hz)	Ελάχιστη διάρκεια – μόνο κεφαλή (δευτερόλεπτα)	Διάρκεια – αναίσθητοποίηση σώματος (δευτερόλεπτα)
>150	1,0	50	2	3

